

Diagramme A  
Diagramme d'évaluation de la grippe **ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS**

**Votre enfant présente-t-il l'un des symptômes suivants?**

- Il a une température de 38 °C (100,4 °F) ou plus

**OU**

- Il a de la fièvre et a eu des tremblements ou des frissons au cours des 24 heures dernières

**OUI**

**NON**

**Votre enfant a-t-il récemment présenté l'un des symptômes suivants?**

- Irritabilité?
- Toux ou pleurs rauques?
- Mal de gorge?
- Manque d'énergie ou perte d'intérêt envers ses jouets?
- Réduction de la consommation d'aliments ou de liquides?
- Diarrhée ou vomissements?
- Maux de tête?
- Douleurs corporelles?

**Votre enfant a-t-il récemment présenté l'un des symptômes suivants?**

- Irritabilité?
- Toux ou pleurs rauques?
- Mal de gorge?
- Manque d'énergie ou perte d'intérêt envers ses jouets?
- Réduction de la consommation d'aliments ou de liquides?
- Diarrhée ou vomissements?
- Maux de tête?
- Douleurs corporelles?

**OUI**

**NON**

**OUI**

**NON**

**Les symptômes sont-ils apparus au cours des 48 heures dernières?**

***Renseignements supplémentaires à la page suivante.***

**Il est possible que votre enfant ait la grippe**

- Vous devriez pouvoir le soigner à domicile.
- Vous pouvez aussi appeler **Télesanté Ontario au 1 866 797-0000 ou ATS 1 866 797-0007** pour parler à une infirmière autorisée. Celle-ci peut vous donner des directives au téléphone ou vous conseiller de consulter un professionnel de la santé.
- Si votre enfant ne commence pas à se sentir mieux après quelques jours ou si ses symptômes s'aggravent, appelez **Télesanté Ontario** ou communiquez avec votre professionnel de la santé.

**Il est possible que votre enfant ait la grippe**

- Vous devriez pouvoir le soigner à domicile.
- Vous pouvez aussi appeler **Télesanté Ontario au 1 866 797-0000 ou ATS 1 866 797-0007** pour parler à une infirmière autorisée. Celle-ci peut vous donner des directives au téléphone ou vous conseiller de consulter un professionnel de la santé.
- Si votre enfant ne commence pas à se sentir mieux après quelques jours ou si ses symptômes s'aggravent, appelez **Télesanté Ontario** ou communiquez avec votre professionnel de la santé.


**Votre enfant n'a probablement pas la grippe**

- Vous devriez pouvoir le soigner à domicile.
- Si vous êtes quand même inquiet, appelez **Télesanté Ontario au 1 866 797-0000 ou ATS 1 866 797-0007** pour parler à une infirmière autorisée. Celle-ci peut vous donner des directives au téléphone ou vous conseiller de consulter un professionnel de la santé.
- Si votre enfant ne commence pas à se sentir mieux après quelques jours ou si ses symptômes s'aggravent, appelez **Télesanté Ontario** ou communiquez avec votre professionnel de la santé.



## Diagramme B

Diagramme d'autodépistage de la grippe chez les personnes âgées de **5 ans ou plus** qui **PRÉSENTENT** un **risque élevé** de complications liées à la grippe



## Diagramme B

Diagramme d'autodépistage de la grippe chez les personnes âgées de **5 ans ou plus** qui **PRÉSENTENT** un **risque élevé** de complications liées à la grippe


*(Suite)*

**Rendez-vous au service d'urgence de l'hôpital le plus proche ou composez le 911 immédiatement si vous ou votre enfant présentez l'un des symptômes suivants :**

- Difficulté à respirer ou essoufflement en bougeant peu ou au repos
- Vomissements continuels ou diarrhée grave accompagnés de signes de déshydratation, tels que sécheresse de la langue et de la bouche, réduction de la fréquence urinaire (aucune production d'urine depuis 6-8 heures) ou forte coloration jaune ou orange de l'urine
- Raideur de la nuque, sensibilité à la lumière
- Crises convulsives ou convulsions
- Confusion ou désorientation

## Diagramme C

Diagramme d'autodépistage de la grippe chez les personnes âgées de **5 ans ou plus** qui **NE PRÉSENTENT PAS un risque élevé** de complications liées à la grippe



## Diagramme C

Diagramme d'autodépistage de la grippe chez les personnes âgées de **5 ans ou plus** qui **NE PRÉSENTENT PAS un risque élevé** de complications liées à la grippe

*(Suite)*

**Rendez-vous au service d'urgence de l'hôpital le plus proche ou composez le 911 immédiatement si vous ou votre enfant présentez l'un des symptômes suivants :**

- Difficulté à respirer ou essoufflement en bougeant peu ou au repos
- Vomissements continuels ou diarrhée grave accompagnés de signes de déshydratation, tels que sécheresse de la langue et de la bouche, réduction de la fréquence urinaire (aucune production d'urine depuis 6-8 heures) ou forte coloration jaune ou orange de l'urine
- Raideur de la nuque, sensibilité à la lumière
- Crises convulsives ou convulsions
- Confusion ou désorientation